


# VACCINATI o GUARITI

Vaccinati con dose booster o che abbiano completato ciclo primario da meno di 120gg o che siano guariti da meno di 120 gg




\* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi.

\*\* Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2a, 3a o 4a generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.

## ISOLAMENTO

# NON VACCINATI

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni o vaccinati con ciclo primario completo da più di 120 giorni




- \* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi
- \*\* Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2a, 3a e 4a generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.

# ISOLAMENTO

# VACCINATI o GUARITI

Vaccinati con dose booster o che abbiano completato ciclo primario da meno di 120gg o che siano guariti da meno di 120 gg




Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

# CONTATTO STRETTO - QUARANTENA

# VACCINATI o GUARITI

Da più di 120gg

**PARALLELO 45**  
CENRO DI FORMAZIONE  
ROVIGO




Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

# CONTATTO STRETTO - QUARANTENA

**PARALLELO 45**  
CENRO DI FORMAZIONE  
ROVIGO

# NON VACCINATI

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni o vaccinati con ciclo primario completo da più di 120 giorni



Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

# CONTATTO STRETTO - QUARANTENA